

ESTRATTO DAL VOLUME I<sup>o</sup>

DELL'OPERA

# IL RUWENZORI

**Relazioni scientifiche**

DOTT. GIUSEPPE NOBILI

Crostacei





DOTT. GIUSEPPE NOBILI

---

Crostacei.

---

DECAPODA (1)

**Potamon (Potamonautes) Aloysii Sabaudiae** Nobili.

Potamon thorace subplano, sed lateribus declivibus et parce inflatis. Frons tertiam carapacis partem fere aequans, antice subrecta sed paululum late emarginata. Oculi subrecti parvi, spina extraorbitalis triangularis orbita non longior; oculi mediocres.

Tergum carapacis conspique sutura cervicali notatum; sutura cardiogastrica quoque conspicua; regulis branchialibus minimis. Sulcus epigastricus brevis, laevis, bifurcatus. Margo posterior minus quam dimidia carapacis latitudo, plus quam tertiam partem aequans. Abdomen maris triangulare, regulare, laeve; penis uncus acutus, basi pilosus. Pedes laeves in mari subaequales. Abdomen foeminae regulariter semicirculatum.

**Parathelphusa nilotica** Edw.

Aliquot specimina in lacu Victoria, prope Toro atque Ibanda collegit clarus Dr. A. Roccati. Specimina aliquantum sed laeviter differunt a speciminibus ex Nili valle.

ISOPODA

**Synarmadilloides** Nobili.

**Synarmadilloides Roccatii** Nobili.

Corpus valde in globum contractile. Flagellum antennarum externarum triarticulatum; mandibula incisiva; lacinia anterior maxillae prioris

---

(1) Per le diagnosi preventive delle specie seguenti Confr. Boll. dei Musei di Zool. e Anat. Comp. di Torino vol. XXI. n. 544, 1906.

paris (Hansenii maxillula) penicillis 8-12; maxillae secundi paris penicillis duobus. Maxillipes normales apice acuto, unco, setoso. Hypopharynx optime constituta, distincte quadriloba. Pedes gressorii et gnathopodes normales. Telson rotundate truncatum; uropodes normales, aequales, ramo interno biarticulato, externo simplice; endopopodus supra angulum externum basipodi incertus, obsolete biarticulatus.

*Habitat*: Toro et in Monte Ruwenzori (3000 m.).

---







